

# 乳幼児期に受ける予防接種

【接種場所】 予防接種実施医療機関

- ※ 接種間隔や回数、対象年齢をよく確認して、接種してください。
- ※ 里帰り出産等で県外での接種を希望される方は、事前に申請が必要で、榛東村保健相談センターまでご相談ください。

【年齢の考え方】

- ・以上…誕生日の前日から
- ・未満…誕生日の前日まで



	種類と回数		対象年齢	
生後6週を過ぎたら	ロタウイルス			
	ロタリックス	27日以上の間隔で2回	生後6週0日後から24週0日後まで	
	ロタテック	27日以上の間隔で3回	生後6週0日後から32週0日後まで	
生後2か月を過ぎたら	Hib (ヒブ)	4回 ※接種開始年齢により接種回数は異なります(下記参照)。	生後2か月以上 5歳未満	
	小児用肺炎球菌			
	B型肝炎	3回	生後2か月以上 9か月未満	
生後3か月を過ぎたら	四種混合 (不活化ポリオ、ジフテリア、百日せき、破傷風)		生後3か月以上 7歳6か月未満 (標準年齢：1歳までに)	
	○初回	20日以上の間隔で 3回		
	○追加	1回 (初回終了1年～1年半後)		
生後5か月を過ぎたら	BCG		生後5か月以上 1歳未満	
1歳を過ぎたら	麻しん風しん (混合) 1期	1回	1歳以上 2歳未満	
	水痘 (みずぼうそう)	3か月以上の間隔で	2回	1歳以上 3歳未満
3歳を過ぎたら	日本脳炎 1期		生後6か月以上 7歳6か月未満 (標準年齢：4歳までに)	
	○初回	6日以上の間隔で 2回		
	○追加	1回 (初回終了1年後)		
就学前 (年長児)	麻しん風しん (混合) 2期		1回	小学校就学前の1年間

※ 予診票は近くなったら配付します。

## \* ヒブの接種回数と間隔

◎ 生後2か月～7か月未満に開始 → 4回 (初回接種3回+追加接種1回)

- ・初回接種 (3回) … 1歳未満までに、27日以上 (標準的には27日から56日まで) の間隔をおいて接種します。
  - ・追加接種 (1回) … 3回目から7か月以上 (標準的には7か月から13か月未満) の間隔をおいて接種します。
- ※ただし、2回目、3回目の接種は1歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は接種は行わない。追加接種は、最終接種から27日以上の間隔をおいて行います。

◎ 生後7か月～1歳未満に開始 → 3回 (初回接種2回+追加接種1回)

- ・初回接種 (2回) … 1歳未満までに、27日以上 (標準的には27日から56日まで) の間隔をおいて接種します。
  - ・追加接種 (1回) … 2回目から7か月以上 (標準的には7か月から13か月未満) の間隔をおいて接種します。
- ※ただし、2回目の接種は1歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は接種は行わない。追加接種は、1回目接種から27日以上の間隔をおいて行います。

◎ 1歳～5歳未満に開始 → 1回

## \* 肺炎球菌の接種回数と間隔

◎ 生後2か月～7か月未満に開始 → 4回 (初回接種3回+追加接種1回)

- ・初回接種 (3回) … 2歳未満 (標準的には1歳未満) までに、27日以上の間隔をおいて接種します。
  - ・追加接種 (1回) … 3回目から60日以上の間隔をおいた後、1歳以降に接種をします。
- ※ただし、2回目、3回目の接種は2歳未満までに行う。また、1歳を超えて2回目の接種を行った場合は、3回目の接種は行わない (追加接種は実施可能)。

◎ 生後7か月～1歳未満に開始 → 3回 (初回接種2回+追加接種1回)

- ・初回接種 (2回) … 2歳未満 (標準的には1歳未満) までに、27日以上の間隔をおいて接種します。
  - ・追加接種 (1回) … 2回目から60日以上の間隔をおいた後、1歳以降に接種を行います。
- ※ただし、2回目の接種は2歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない (追加接種は実施可能)。

◎ 1歳～2歳未満に開始 → 2回 (初回接種2回)

60日以上の間隔で2回接種

◎ 2歳～5歳未満に開始 → 1回

